

Oportunidades alternativas para fincas pequeñas: revisión de la producción de duraznos y nectarinas¹

Ali Sarkhosh, Mercy Olmstead, Jeff Williamson, Jose Chaparro, Juanita Popenoe; traducido por Eva Pabon²

El suave clima invernal de Florida y el comienzo temprano de la primavera ofrecen oportunidades únicas para la producción de duraznos y nectarinas de temporada temprana. Actualmente, Florida produce algunos de los duraznos y nectarinas de florecida temporada para producción comercial en América del Norte (Figura 1). Por ejemplo, los duraznos 'UFSun' y 'UFBest', que están adaptados a la Florida central y sur-central, tienen un período de desarrollo de la fruta (FDP) desde la floración hasta la cosecha de aproximadamente ochenta días. Cuando se cultiva en el centro-sur de Florida, la fruta madura a principios de abril y es uno de los primeros duraznos comerciales en madurar en América del Norte. Otros cultivares de durazno y nectarinas adaptados al centro-sur y norte de Florida maduran poco después. Durante los últimos doce años, la Universidad de Florida ha lanzado muchos cultivares nuevos de durazno y nectarina (Tabla 1). Estos nuevos y mejorados cultivares han aumentado el potencial de expansión del aspecto comercial de melocotones y nectarinas en gran parte de la península de Florida y en las regiones de la Costa del Golfo del sureste de los Estados Unidos.

Requerimiento de frío

Los duraznos y las nectarinas son árboles frutales de zonas templadas que requieren una exposición mínima de temperaturas frías acumuladas (entre 32 °F y 45 °F) para reanudar su crecimiento normal en la primavera. Esto se conoce como el requerimiento de frío del cultivar (Richardson et al. 1974; Sherman y Rodríguez-Alcazar 1987; Sharpe et al. 1990). El requerimiento de frío generalmente se expresa en horas frío (HF) (toma en cuenta cualquier hora con una temperatura entre 32 °F y 45 °F) en Florida desde octubre hasta la primera semana de enero. Cada cultivar tiene su propio requisito característico de enfriamiento, que determina parcialmente su adaptabilidad a una determinada región del estado (Tabla 2; Figura 2). La importancia del lugar apropiado y la selección de cultivares debe ser enfatizada. Por ejemplo, el "Gulfking" (350 cu) está adaptado al área de Gainesville, pero no recibiría suficiente frío en la mayoría de los inviernos para crecer bien al sur de Ocala. Por el contrario, si el requisito de enfriamiento del cultivar es demasiado bajo para el área donde se planta, existe una mayor probabilidad de que las heladas de fines de invierno maten las flores y los frutos jóvenes. Se pierden más duraznos y nectarinas debido al daño de las heladas en el sureste de los Estados Unidos que por cualquier otra causa.



Figura 1. 'UFSun' durazno.

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS.



Figura 2. Las unidades de enfriamiento acumuladas (entre 32 °F y 45 °F) hasta el 10 de febrero en el 75 % de los inviernos.

Crédito: UF / IFAS

Situación de mercadeo

Los incentivos para el cultivo de duraznos y nectarinos en Florida son los siguientes 1) la producción y mercadeo de duraznos y nectarinos frescos de Florida se dan antes que las del centro de Georgia, Carolina del Sur y California lleguen al mercado, y 2) la producción de fruta de calidad cuando casi no hay otra fruta fresca de calidad disponible (Figura 3). Los duraznos y las nectarinas se pueden producir continuamente desde finales de marzo hasta finales de mayo o principios de junio en Florida, dependiendo del clima. A medida que la precipitación aumenta durante los meses de verano, también aumentan los problemas de enfermedades y plagas en duraznos y nectarinos. Cultivares de maduración tardía tienen poco o ningún potencial en Florida debido al aumento de plagas y enfermedades y el aumento de la competencia del mercado.




Figura 3. Importaciones mensuales promedio de duraznos y nectarinas (2001-2011).

Crédito: Servicio de Investigación Económica, USDA-ARS

Para mercadear duraznos de alta calidad, es necesario cosechar cada cultivar de tres a cuatro veces con un descanso de dos días para obtener frutos que estén "maduros en los árboles". Cuando se cosecha en esta etapa, el fruto tiene el mejor sabor. Para el envío a larga distancia, la fruta debe ser manejada con más cuidado al momento de, clasificación, enfriamiento y empaque. Esto requiere una inversión considerable en una empacadora, que probablemente no sea económicamente factible para una finca de menos 100-150 acres. Sin embargo, las alternativas de comercialización para los pequeños productores incluyen unirse a una cooperativa de productores, realizar ventas directas a supermercados o mercados de productos, y optar por operaciones de U-pick, mercados de agricultores o puestos de venta en carretera. Es importante cultivar varios cultivares que maduren sucesivamente para asegurar un flujo constante de fruta madura. Este período de cosecha más largo ayuda con el mercadeo y el uso eficiente de la mano de obra y las instalaciones de empaque.

Las operaciones comerciales de duraznos y nectarinas en el sureste de los Estados Unidos pueden tener costos de producción previos a la cosecha de aproximadamente \$4000 por acre (Morgan et al. 2010, M. Olmstead, pers. comm.). Para obtener más información sobre el costo de producción y la rentabilidad de una finca de duraznos, vea la publicación en línea EDIS

<https://edis.ifas.ufl.edu/publication/FE1016> (Singerman et al. 2017). Estos costos iniciales varían si la tierra ya está comprada y si el riego está disponible. Debido a que los costos de mercadeo de los cultivos comerciales son relativamente altos, las operaciones "cosecha tu propia fruta" tienen el potencial de reducir en gran medida los costos totales de la finca. Los rendimientos estimados

(brutos) para los productores de duraznos en Florida son aproximadamente cuatro a cinco veces mayores que los de los productores en los estados vecinos del sudeste (Junta de Estadísticas Agrícolas de los Estados Unidos 2011).

Mano de obra

La producción de duraznos y nectarinas requiere altos niveles de mano de obra temporal. Los productores comerciales contratan mano de obra para poda durante la época inactiva de los árboles y en el verano, poda selectiva de frutos y cosecha. Las operaciones familiares a menudo proporcionan su propio trabajo. El momento de las operaciones laborales es especialmente crítico; a menudo, un retraso de unos días en la cosecha puede resultar en gran pérdida de ganancias. Actualmente, el mayor costo de producción de duraznos en Florida es la poda selectiva de frutos y la poda manual. Estas prácticas juntas requieren alrededor de 150 horas por acre, dependiendo del tamaño del árbol y del cuaje de frutos, lo que resulta en un costo anual estimado de \$ 2000 / acre.

Pautas de plantación

Los duraznos y las nectarinas solo se deben plantar en sitios con excelente circulación de aire para reducir el riesgo de daños por heladas en las flores. El aire frío es más denso y se acumula en el punto más bajo del huerto, especialmente en las noches con heladas por radiación. Las heladas por radiación ocurren en noches despejadas con condiciones de viento tranquilo, donde el aire cálido se eleva a medida que el aire frío se acumula cerca del suelo (Figura 4). Una congelación advectiva está dominada por las condiciones de viento y, a menudo, daña severamente las flores y potenciales frutos. En un sitio adecuado, seleccione cultivares con requerimientos de frío ligeramente inferiores al promedio de frío recibido en esa ubicación. Esto ayuda a garantizar un enfriamiento adecuado durante los inviernos inusualmente cálidos; si la finca tiene un excelente flujo de aire, los riesgos de daños a las flores por las heladas primaverales serán mínimos durante los años normales y con mucho frío.




Figura 4. Criterios de selección del sitio para un huerto de frutas con hueso.

Crédito: M. Olmstead, UF / IFAS

La selección de la finca (<http://agroclimate.org/tools/chill-hours-monitoring/>) y la elección del cultivar (<https://edis.ifas.ufl.edu/publication/MG374>) son los dos factores más importantes en el crecimiento exitoso de duraznos y nectarinas. Al seleccionar su lugar de cultivo, evite las áreas bajas caracterizadas por las heladas tardías de primavera. Incluso en el centro de Florida, se pueden tener temperaturas de congelamiento durante febrero y a principios de marzo en lugares fríos; por lo tanto, los sitios con buen fulgo de aire son esenciales para una producción exitosa. Plantar un huerto en el lugar adecuado y con la variedad apropiada permitirá a los productores maximizar la eficiencia de su establecimiento con la cantidad mínima de árboles replantados. Los datos meteorológicos históricos y actuales para áreas específicas de cultivo o finca se pueden encontrar en <https://fawn.ifas.ufl.edu/>.

Los duraznos y las nectarinas se pueden cultivar en una amplia variedad de suelos, siempre que tengan buen drenaje en los 4 a 6 pies superiores del suelo. Evite los suelos "rígidos" a menos que se proporcione un excelente sistema de baldosas de drenaje del subsuelo o sistemas de lecho. Se requiere riego para el crecimiento de los árboles y durante todo el período de desarrollo de la fruta para obtener rendimientos y tamaños de fruta aceptables. Un sistema de riego por aspersión diseñado adecuadamente tiene la ventaja adicional de proteger las flores y los frutos jóvenes de las heladas de fines de invierno y primavera. Para sistemas de riego de bajo volumen, se prefieren los microaspersores a los emisores de goteo. Para evitar rociar plántulas / árboles de camiones con agua, se recomiendan microaspersores con un patrón de rociado de 240 a 300 grados.

Los árboles de 2½ a 4 pies de altura con brotes en junio son buenos para plantar durante la temporada de otoño,

sin embargo los árboles de tamaños más grandes son más difíciles de manejar y más costosos. La distancia de siembra recomendada entre árboles es de 15×20 pies, o 145 árboles por acre. En suelos más claros, las plantaciones de mayor densidad han sido satisfactorias (Tabla 3). Todos los cultivares de durazno y nectarina de Florida son fructíferos y deben plantarse en bloques sólidos para facilitar la aplicación de pesticidas o fertilizante y la cosecha.

Programa cultural

El cultivo de duraznos y nectarinas requiere un alto mantenimiento, que incluye poda, la poda selectiva de frutos, cosecha y detección de plagas y enfermedades (Figura 5). Los duraznos y las nectarinas son susceptibles a una serie de plagas, que incluyen enfermedades, insectos y nematodos. Los nematodos agalladores (*Meloidogyne incognita* y *M. javanica*) son comunes en los suelos de Florida y pueden afectar negativamente la salud de los árboles de duraznos y nectarinas. Además, el recién identificado nematodo de nudo en la raíz de durazno, *M. floridensis* (Handoo et al. 2004), puede infectar portainjertos de durazno comunes como "Nemaguard" y "Okinawa". Por lo tanto, solo un portainjerto resistente a los nematodos de *M. floridensis* como el "Flordaguard" debería usarse en Florida (Sherman et al. 1991). Se debe seguir un programa integrado de manejo de plagas para asegurar una buena calidad de la fruta. Aunque algunas enfermedades e insectos pueden ser graves, generalmente se pueden controlar con un programa de manejo de plagas adecuado. Una guía de manejo de enfermedades y plagas está disponible en línea en https://secure.caes.uga.edu/extension/publications/files/pdf/B%201171_12.PDF. Hay más información disponible sobre duraznos y duraznos en el sitio web de la Universidad de Florida (<https://hos.ifas.ufl.edu/stonefruit/>) y en su oficina local de UF/IFAS Extensión.



Figura 5. Huerto de duraznos en la granja de investigación de la Universidad de Florida ubicada en Citra.

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

Referencias

- Handoo, Z. A., A. P. Nyczepir, D. Esmenjaud, J. G. van der Beek, P. Castagnone-Sereno, L. K. Carta, A. M. Skantar, and J. A. Higgins. 2004. "Morphological, Molecular, and Differential-Host Characterization of *Meloidogyne floridensis* n. Sp. (Nematoda: Meloidogynidae), a Root-Knot Nematode Parasitizing Peach in Florida." *Journal of Nematology* 36 (1): 20–35.
- Morgan, K., J. Braswell, F. Matta, D. Ingram, and B. Layton. 2010. "Peach - Fruit and Nut Planning Budgets." Starkeville: Mississippi State University.
- Richardson, E. A., S. D. Seeley, and D. R. Walker. 1974. "A Model for Estimating the Completion of Rest for 'Redhaven' and 'Elberta' Peach Trees." *HortScience* 9 (4): 331–332.
- Sharpe, R. H., W. B. Sherman, and J. D. Martsolf. 1990. "Peach Cultivars in Florida and Their Chilling Requirements." *Acta Horticulturae* 279:191–197.
- Sherman, W. B., P. M. Lyrene, and R. H. Sharpe. 1991. "'Flordaguard' Peach Rootstock." *HortScience* 26 (4): 427–428.
- Sherman, W. B., and J. Rodriguez-Alcazar. 1987. "Breeding of Low-Chill Peach and Nectarines for Mild Winters." *HortScience* 22:1233–1236.
- United States Agricultural Statistics Board. 2011. "Noncitrus Fruits and Nuts 2010 Summary." <https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x846c/000002568/m326m426x/NoncFruiNu-07-07-2011.pdf>

Tablas

Tables

Tabla 1. Variedades de duraznos y nectarinas lanzadas por el programa de mejoramiento genético de UF desde 2006.

Fecha de lanzamiento	Cultivares
Durazno	
2006	FlordaBest, Gulfcrimson
2008	UFOne
2009	UFGlo
2012	UFBest
2012	GulfAtlas, Gulfsnow
2013	UFGem
Durazno Rootstock	
2007	Sharpe
2016	MP-29
Nectarina	
2006	UFRoyal
2012	Flordarose, Southern Rose

Tabla 2. Requerimientos de enfriamiento para los cultivares de UF duraznos y nectarinas.

Unidades de enfriamiento 32 °F–45 °F	Cultivares	
	Durazno	Nectarina
500–600	Gulfcrest	
400–500	Gulfprince, Gulfcrimson, Gulfsnow, 'Flordaking', 'UFGlo'	
300–400	Flordadawn, UF2000, Flordacrest, Gulfking, UFSharpe	Sundollar, 'Suncoast'
200–300	UFBeauty, UFGold, TropicSnow, 'UFOne', 'UFO', 'Flordabest'	UFRoyal, Sunraycer, Sunmist, UFQueen
100–200	UfSun, UFBest, UFGem, Flordaprince, Flordaglo, TropicBeauty	

Tabla 3. Diversos espaciamientos entre árboles y entre hileras para el establecimiento de huertos.

Espacios entre árboles (pies)	Espacios entre hileras (pies)	Total árboles/acre
15	25	117
15	20	145
10	20	218
10	15	290

¹ Este documento, RFAC018S, es uno de una serie de publicaciones de Horticultural Sciences, Servicio de Extensión Cooperativa de la Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida (UF/IFAS Extension). Fecha de primera publicación: octubre 2020. Revisado febrero 2025. Visite nuestro sitio web Ask IFAS en <https://edis.ifas.ufl.edu>.

² Ali Sarkhosh, profesor asociado y especialista en Extensión en fruticultura y viticultura, UF/IFAS Department of Horticultural Sciences, Gainesville, FL; Mercy Olmstead, global agronomy technology transfer lead, Driscoll's, Watsonville, CA, former associate professor and stonefruit Extension specialist, Department of Horticultural Sciences; Jeff Williamson, profesor retirado, UF/IFAS Department of Horticultural Sciences; Jose X. Chaparro, profesor asociado, cultivo de frutas con hueso, Department of Horticultural Sciences; Juanita Popenoe, agente IV multicondado de Extensión en producción de fruta comercial, emérita, Ph.D., UF/IFAS Extension Lake County; Eva M. Pabon, agente de Extensión II, B.S., horticultura residencial, UF/IFAS Extension Osceola County, Kissimmee FL; UF/IFAS Extension, Gainesville, FL 32611.

El Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) es una Institución con Igualdad de Oportunidades autorizada para proporcionar investigación, información educativa y otros servicios solo a personas e instituciones que operan en cumplimiento con las leyes y políticas federales y estatales aplicables de no discriminación. Para obtener más información sobre cómo obtener otras publicaciones de UF/IFAS Extension, comuníquese con la oficina UF/IFAS Extension de su condado. U.S. Department of Agriculture, UF/IFAS Extension Service, University of Florida, IFAS, Florida A&M University Cooperative Extension Program y Boards of County Commissioners Cooperating. Andra Johnson, decano de UF/IFAS Extension.