

La granada¹

Ali Sarkhosh, Jeff Williamson; traducido por Eva Pabon.²

- **Nombre científico:** *Punica granatum* L.
- **Familia:** Lythraceae



Figura 1. Árbol de granada ('Wonderful' cv.).
Crédito: Ali Sarkhosh, UF/IFAS

Origen e historia

Las granadas son originarias de Asia central y se cultivaron en la antigua Persia, Babilonia, Egipto e India. Las granadas comunes se cultivaron por primera vez en Persia (hoy en día conocido como Irán) durante el año 3000 A.D. La granada fue cultivada extensamente en España, y llegó a México y California con los misioneros en el siglo XVI.

El potencial económico en la producción comercial para el cultivo de granadas en Florida es actualmente desconocido. La investigación científica continúa sobre la posibilidad de encontrar variedades de granadas que puedan crecer en Florida. Las condiciones ambientales, con una alta temporada húmeda en la Florida y un clima caluroso, son factores que son favorables para las enfermedades en las granadas y eso reduce la calidad de esta fruta, especialmente para las variedades de temporada tardía como la 'Wonderful'. 'Wonderful' es el principal cultivar comercial que se originó en la Florida. Para reducir las enfermedades y evitar la competencia de comercialización con las granadas de California, la investigación para la producción de granadas en la Florida

debe centrarse en buscar variedades de temporada temprana que puedan cosecharse en julio y agosto.

Clima

Las granadas se pueden cultivar desde climas templados hasta tropicales. Sin embargo, la mejor calidad de fruta se produce en regiones con inviernos fríos y veranos calurosos y secos (clima mediterráneo). La granada es más resistente al frío que los cítricos. Sin embargo, los cultivares de granada varían en tolerancia a las temperaturas muy frías o heladas. En algunos casos, temperaturas por debajo de 12 °F (-11 °C) pueden dañar severamente árboles que están hibernando (Figura 2); los árboles que no están hibernando pueden dañarse con temperaturas más altas de 28 °F (-2 °C, Figura 3). Varios miles de acres se cultivan en California y algunos productores están llevando a cabo pruebas regionales con diferentes variedades en Florida, Georgia, Arizona, Texas y otros estados en los EE. UU.



Figura 2. Daño por congelación (12 °F) en un árbol en hibernación.
Crédito: Ali Sarkhosh, UF/IFAS



Figura 3. Daño por congelación (12 °F) en un árbol en hibernación.
Crédito: Ali Sarkhosh, UF/IFAS

Descripción

Normalmente el árbol de granada es un arbusto denso y deciduo, que puede alcanzar una altura de 6–12 pies (2–4 m). La planta tiene ramas finas y espinosas. Puede ser podado como un árbol pequeño que alcanza 12–20 pies (4–7 m) de altura.

La granada es una planta ornamental atractiva y existen algunas variedades que no producen fruto que están disponibles para ese propósito (Figura 4).



Figura 4. Granada ornamental.
Crédito: A. Yavari

Las hojas de granada son brillantes, de color verde oscuro. La forma de la hoja es oblonga a ovalada, de 1–1,25 ft (2,5–3 cm) de largo. Las hojas se organizan opuestas y los pares se cruzan alternativamente en ángulos rectos y se agrupan en ramillas cortas (Figura 5).



Figura 5. Hojas de granada y fruta joven.
Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

Las flores son de color rojo-anaranjado brillante, de 1,5–2,5 in (4–6 cm) de diámetro con pétalos arrugados y numerosos estambres. Las flores nacen solitarias o en pequeños racimos en ángulo hacia el final de las ramillas. Las flores son "perfectas", contienen partes masculinas y femeninas, sin embargo, los árboles de granada generalmente llevan dos tipos de flores; es decir, femenino (produce fruta, Figura 6), masculino (no produce fruta, Figura 7). En las flores masculinas, los pistilos no se desarrollan como en las flores femeninas y no producen fruto. Las flores generalmente son auto polinizadas.



Figura 6. Flor femenina (flor que produce fruto).

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS



Figura 7. Flor masculina (flor que no produce fruto).

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

Cultivares

El cultivar 'Wonderful' (Figura 9) se cultiva comercialmente en California, pero los esquejes provienen de Florida. La temporada húmeda y el clima

caluroso de la Florida, son factores que reducen la calidad de las frutas de maduración tardía, como las del 'Wonderful'. Por lo tanto, la variedad 'Wonderful' no es un cultivar adecuado para Florida. Además, los cultivares de maduración temprana que maduran en julio y agosto, en Florida, evitarán la competencia de las granadas comerciales de California. Sin embargo, en este momento, el potencial económico para cultivar el árbol de granada comercialmente en Florida es desconocido.



Figura 8. Fruta de granada, arilo y semilla.

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

Hay muchas variedades de granadas con diferentes características de frutas que se cultivan en Florida. La investigación continúa sobre la posibilidad de encontrar cultivares de granada que puedan crecer en Florida (Figura 10). Hoy en día, las granadas se pueden comprar en algunos supermercados no solo como frutas y jugos, sino también como arilos envasados. Se ha desarrollado una máquina automática de extracción de arilo con la capacidad de extraer arilos de 100 toneladas de granada por día. Existe la posibilidad de que diferentes variedades de granada con diferentes colores de arilo puedan comercializarse en el futuro. Sin embargo, se necesitan más estudios y pruebas sensoriales sobre las características de las frutas de las variedades cultivadas en Florida. Las evaluaciones iniciales de algunas variedades de granada indican que las que no producen fruta con buena forma, tamaño y apariencia en Florida podrían ser adecuadas para arilo o jugo envasados (Figura 10). Las enfermedades que se desarrollan durante la temporada de cultivo y el clima caliente / húmedo de la Florida reducen la calidad de la fruta y continúan siendo una gran limitación para la producción.



Figura 9. Cultivar 'Wonderful'.
Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

pulgadas (15–20 cm) de largo y del grosor de un lápiz o más ancho de diámetro (Figura 12). En Florida, los esquejes de madera dura deben tomarse en enero o febrero y colocarse verticalmente en el suelo con los 2–4 nodos superiores expuestos. Los esquejes pueden dejarse en hileras de vivero durante 1 o 2 años. Las plantas propagadas por semillas puede que no sean idénticas a la fruta, pero las semillas germinarán en 45–60 días. El acodo también es exitoso, pero requiere más mano de obra.



Figura 11. Propagación por esqueje.
Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS




Figura 10. Características del fruto, semillas y zumos de algunas variedades de granadas cultivadas localmente en Florida, cosechadas en agosto de 2018; a) 'Vkusnyi' b) 'Crab' c) 'Mack Glass' d) 'Ever Sweet'.
Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

Propagación

Los árboles se propagan más fácil utilizando esquejes de madera dura durante el invierno, estos deben ser de 6–8

Suelos

Las granadas se producen mejor en suelos francos profundos, pero se pueden adaptar a muchos tipos de suelos, desde arena pura hasta arcilla pesada. El rendimiento suele ser bajo en arena, mientras que el color de la fruta es pobre en arcilla. El crecimiento en suelos alcalinos es pobre. El crecimiento óptimo se asocia con suelos bien drenados, no pesados o húmedos en el rango de pH de 5,5–7,0.

Irrigación

Los requisitos de agua para la granada son aproximadamente los mismos que para los cítricos: 50–60 pulgadas (125–150 cm) por año. Los árboles deben ser irrigados cada 7–10 días en ausencia de lluvias significativas. Durante la maduración de la fruta generalmente se recomienda reducir el riego gradualmente para reducir las fracturas, pero también para mejorar el desarrollo del sabor y el color. Las lluvias de verano pueden ser un problema en algunas partes de Florida. Los cambios repentinos en la cantidad y el tiempo de riego a menudo conducen a la división de la fruta, especialmente unas semanas antes de la cosecha. Mantenga una humedad adecuada del suelo a finales del verano y principios del otoño para reducir la posible

división de la fruta. Las granadas son tolerantes a algunas inundaciones.

Sembrado y distancia entre plantas

Plante árboles a comienzos de primavera (febrero–marzo), evitando las heladas tardías. El suelo debe ser trabajado y no mojado. Cuando se usan como un seto vivo, las plantas se siembran a 6–9 pies (2–3 m) de distancia.

Los retoños llenarán espacios y producirán un seto vivo compacto. La distancia de siembra de 10–16 pies (3–5 m) entre las plantas y 13–20 pies (4–6 m) entre las hileras se usa para los huertos, y se debe mantener una distancia de siembra similar para los árboles de jardín en la casa (Figura 13).




Figura 13. Espacio entre árboles.

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

Entrenamiento y poda

Los árboles que poseen hábitos de crecimiento arbustivo tupido tienden a generar muchos retoños o puntos de crecimiento desde la raíz hasta la corona. Para propósitos de producción comercial estos árboles deben entrenarse a través de la poda para que solo se desarrolle un pequeño grupo de tronco o un tronco (Figura 13). Aquellos retoños adicionales que crecen cerca del tronco o tronco(s) principal(es) deben eliminarse. Durante los primeros dos años, la poda promueve una forma robusta y compacta de crecimiento. Al momento de la siembra, los árboles se deben cortar o podar a 2–2,5 pies (60–75 cm) y desarrollar de tres a cinco ramas simétricamente esparcidas para promover el crecimiento de nuevos brotes. Estos brotes no deben llegar a menos de 12 (20–25 cm) pulgadas del suelo. Corte las ramas a 3/5 de su longitud durante el invierno después de la siembra. Elimine las ramas y brotes que interfieran dejando dos o tres brotes por rama andamio.



Figura 13. Sistema de entrenamiento, izquierda: un solo tronco, derecha: múltiples troncos.

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

Las ramas que dan fruto se doblarán o romperán por el exceso de fruto a menos que se practique el aclareo de la fruta o se realice una poda para reducir la carga de la cosecha. La fruta que toque el suelo se pudrirá o se dañará por plagas (Figura 14).



Figura 14. Se muestra el soporte provisto al árbol de granada para mantener la fructificación fuerte.

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

Consideraciones especiales

Los árboles de granada se auto polinizan. La caída severa de fruta durante el período juvenil de la planta (3–5 años) es normal. La caída de la fruta aumenta por prácticas que inducen el crecimiento vegetativo, como la fertilización y el riego excesivos. Evite poner árboles jóvenes en condiciones estresantes. La caída de fruta es menos severa en árboles maduros que en árboles más jóvenes.

Enfermedad

La enfermedad más destructiva observada en Florida es la antracnosis causada por un hongo del género *Colletotrichum* sp (Figura 16). La enfermedad puede afectar las hojas, los tallos, las flores y la fruta. Los síntomas en la hoja incluyen áreas circulares a angulares pequeñas, oscuras, de color marrón rojizo a negro, de un tamaño de 0,25 pulgadas (4–5 mm) de diámetro. Las hojas infectadas son de color verde pálido y se caen prematuramente. Los síntomas en la fruta son manchas pequeñas, conspicuas, de color marrón oscuro, inicialmente circulares, que se vuelven irregulares. Para prevenir esta enfermedad se recomienda tres aplicaciones de fungicida de cobre neutral para reducir el impacto de la enfermedad.



Figura 15. Daño de la antracnosis causado por *Colletotrichum* sp en la fruta de la granada.

Crédito: G. Vallad, UF/iFAS

Insectos

Queresas y ácaros ocasionalmente atacan la planta, pero estos hacen poco daño. El polvo de azufre aplicado a principios de junio ofrece un buen control de los ácaros. Las cochinillas pueden controlarse con una aplicación de aceite hortícola al 3 % durante el invierno cuando las hojas no están presentes. Los barrenadores de árboles también pueden infestar y matar árboles (Figura 16).



Figura 16. Daño del barrenador de cabeza plana al árbol de granada en Cross City en FL.

Crédito: A. Sarkhosh, UF/IFAS

El Dr. Bill Castle, profesor emérito de Horticultura de IFAS, de la Universidad de Florida ha desarrollado el sitio web de granada para Florida, [Pomegranates](#) (en inglés), que contiene información más detallada sobre la botánica de la granada, el cultivo, los cultivares, los viveros, las asociaciones de los productores y más información. Aquellos interesados en aprender más sobre las granadas en Florida se les invita a visitar este sitio web.

Referencias

- Holland. D., Hatib. K., Bar-Ya'akov. I. (2009).
"Pomegranate: botany, horticulture, breeding."
Horticultural Review 35: 127–191.
<https://doi.org/10.1002/9780470593776.ch2>
- Sarkhosh, A., Zamani, Z., Fatahi, R., Sayyari, M. (2009).
"Antioxidant activity, total phenols, anthocyanin,
ascorbic acid content and woody portion index (wpi) in
Iranian Soft-Seed pomegranate Fruits." *Global Science
Books. Food* 1: 68–72.
- Sarkhosh, A., Zamani, Z., Fatahi, R., Ranjbar, H.,
Vazifeshenas, M.R. (2008). "Evaluation of Iranian soft-
seed pomegranate accessions by using simple and
multivariate analysis methods." *Tree and Forestry
Science and Biotechnology* 2: 18–25.
- Zamani, Z., Sarkhosh, A., Fatahi, R., Ebadi, A. (2007).
"Genetic relationships among pomegranate genotypes
studied by fruit characteristics and RAPD markers." *The
Journal of Horticulture Science & Biotechnology* 82: 11–
18.
<https://doi.org/10.1080/14620316.2007.11512192>

¹ Este documento, HS1044, es uno de una serie de publicaciones de Horticultural Sciences, Servicio de Extensión Cooperativa de la Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida (UF/IFAS Extension). Fecha de primera publicación: abril 2004. Revisado marzo 2015, octubre 2018, abril 2019, septiembre 2026. Visite nuestro sitio web EDIS en <https://edis.ifas.ufl.edu>. Traducido de la versión en inglés (HS44) al español en febrero de 2019 por Eva Pabon.

² Ali Sarkhosh, profesor asociado y especialista en Extensión en fruticultura y viticultura, UF/IFAS Horticultural Sciences, Gainesville, FL; Eva M. Pabon, agente de Extensión II, B.S., horticultura residencial, UF/IFAS Extension Osceola County, Kissimmee FL; Jeff Williamson, profesor retirado, UF/IFAS Horticultural Sciences; UF/IFAS Extension, Gainesville, FL 32611.

El Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) es una Institución con Igualdad de Oportunidades autorizada para proporcionar investigación, información educativa y otros servicios solo a personas e instituciones que operan en cumplimiento con las leyes y políticas federales y estatales aplicables de no discriminación. Para obtener más información sobre cómo obtener otras publicaciones de UF/IFAS Extension, comuníquese con la oficina UF/IFAS Extension de su condado. U.S. Department of Agriculture, UF/IFAS Extension Service, University of Florida, IFAS, Florida A&M University Cooperative Extension Program y Boards of County Commissioners Cooperating. Andra Johnson, decano de UF/IFAS Extension.